



INFORMATION FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage anweisungswise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen bei Katarrhen der oberen Luftwege angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei Säuglingen und Kleinkindern nicht anwenden (Camphora D3). Bei Erkältungsanfälligkeit bei Kindern empfiehlt es sich einen Arzt / eine Ärztin zu konsultieren.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

– an anderen Krankheiten leiden,

– Allergien haben oder

– andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dürfen Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, bei akuten Beschwerden anfangs alle 15-30 Minuten 10 Tropfen in etwas Wasser über mehrere Stunden einnehmen. Mit Nachlassen des Fiebers, Einnahme von 10-15 Tropfen alle 1-2 Stunden, bis zur Ausheilung. Bei akutem Schnupfen oder plötzlichen Erkältungen mit Beteiligung der Schleimhäute der oberen Luftwege alle 1-2 Stunden 10-15 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirkt zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Die Tropfen enthalten 35 Vol.-% Alkohol.

Was ist in Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Aconitum napellus D4 1 ml, Baptisia tinctoria D4 1 ml, Bryonia cretica D4 1 ml, Camphora D3 1 ml, Eucalyptus globulus D3 1 ml, Eupatorium perfoliatum D3 1 ml, Ferri phosphas D8 1 ml, Gelsemium sempervirens D6 1 ml, Schoenocaulon officinale (Sabadilla) D6 1 ml und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol. Enthält 35 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer:

45038 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaberin:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Herstellerin:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim

Diese Packungsbeilage wurde in 09/2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan

Médicament homéopathique

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan peuvent être utilisées en cas de catarrhes des voies respiratoires supérieures.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Ne pas utiliser pour des nourrissons et des petits enfants (Camphora D3). Si des enfants sont sujets aux refroidissements il est conseillé de consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

– vous souffrez d'une autre maladie,

– vous êtes allergique,

– vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avoir du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan?

Sauf prescription contraire du médecin, et dans les cas aigus, prendre au début 10 gouttes toutes les 15 à 30 minutes dans un peu d'eau durant quelques heures. Quand la fièvre baisse, prendre



10 à 15 gouttes toutes les 1 à 2 heures pendant quelques jours encore jusqu'à la guérison. En cas de rhumes ou de refroidissements soudains avec atteinte des muqueuses des voies respiratoires supérieures, prendre 10 à 15 gouttes toutes les 1 à 2 heures dans un peu d'eau. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les gouttes contiennent 35 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan?

10 ml contiennent: Aconitum napellus D4 1 ml, Baptisia tinctoria D4 1 ml, Bryonia cretica D4 1 ml, Camphora D3 1 ml, Eucalyptus globulus D3 1 ml, Eupatorium perfoliatum D3 1 ml, Ferri phosphas D8 1 ml, Gelsemium sempervirens D6 1 ml, Schoenocaulon officinale (Sabadilla) D6 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 35 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation: 45038 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabricant:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic): 09/2005.

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan

Medicinale omeopatico

In quali casi trovano impiego le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan trovano principalmente impiego in caso di mucositi catarrali delle prime vie respiratorie.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

È sconsigliato l'impiego nell'età neonatale e nella prima infanzia (Camphora D3). In caso di predisposizione ai raffreddamenti in un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan ?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere nei casi acuti inizialmente 10 gocce, in poca acqua, ogni 15-30 minuti. All'abbassarsi della temperatura portare il dosaggio a 10-15 gocce ogni 1-2 ore fino alla guarigione. Nelle riniti acute o nei raffreddamenti improvvisi accompagnati di affezioni flogistiche delle vie respiratorie superiori, somministrare 10-15 gocce, in poca acqua, ogni 1-2 ore. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan ?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente, interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan e informi il suo medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15 - 25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista.

Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan ?

10 ml contengono: Aconitum napellus D4 1 ml, Baptisia tinctoria D4 1 ml, Bryonia cretica D4 1 ml, Camphora D3 1 ml, Eucalyptus globulus D3 1 ml, Eupatorium perfoliatum D3 1 ml, Ferri phosphas D8 1 ml, Gelsemium sempervirens D6 1 ml, Schoenocaulon officinale (Sabadilla) D6 1 ml e come excipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35 % vol.

Numeri dell'omologazione: 45038 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabbricante:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Data dell'ultima revisione da parte dell'autorità farmaceutica competente (Swissmedic) di questo foglietto illustrativo: 09/2005.